

**Examenul național de bacalaureat 2022****Proba E.c)****Matematică M\_mate-info****Barem de evaluare și de notare****Varianta 3**

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică

**SUBIECTUL I****(30 puncte)**

<b>5p</b>	1. $b_2 = b_1 q, b_3 = b_1 q^2, b_5 = b_1 q^4, b_6 = b_1 q^5,$ $b_1 q(1+q^3) = 156, b_1 q^2(1+q^3) = 468$ $q = 3$	<b>1p</b> <b>2p</b> <b>2p</b>
<b>5p</b>	2. $G_f \cap Ox = \emptyset \Leftrightarrow \Delta < 0$ $\Delta < 0 \Leftrightarrow m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow m \in (-2, 2) \cap \mathbf{Z} \Leftrightarrow m \in \{-1, 0, 1\}$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>5p</b>	3. $\frac{4^x}{4} - 2 \cdot 2^x + 3 = 0$ $2^x = t, t > 0 \Rightarrow t^2 - 8t + 12 = 0$ $t_1 = 2 \Rightarrow x = 1$ $t_2 = 6 \Rightarrow x = \log_2 6$	<b>1p</b> <b>2p</b> <b>1p</b> <b>1p</b>
<b>5p</b>	4. Numărul submulțimilor nevide cu un număr par de elemente este: $C_n^2 + C_n^4 + C_n^6 + \dots = 2^{n-1} - C_n^0 = 2^{n-1} - 1$ $2^{n-1} - 1 = 511 \Leftrightarrow 2^{n-1} = 512 \Rightarrow n-1=9 \Rightarrow n=10$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>5p</b>	5. $\overrightarrow{BT} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BM})$ . Cum $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BM} \Rightarrow \overrightarrow{BT} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ $\overrightarrow{BT} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \Rightarrow \overrightarrow{BT} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>5p</b>	6. $\sin A + \cos A = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} A = -1$ $A \in (0, \pi) \Rightarrow A = \frac{3\pi}{4}$	<b>2p</b> <b>3p</b>

**SUBIECTUL al II-lea****(30 puncte)**

<b>5p</b>	1. a) $A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & i & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & i & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$ $= -i + 0 + 0 - (-2i) - 0 - 0 = i$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>5p</b>	b) $\det A(a) = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ a & i & a \\ -1 & a & -1 \end{vmatrix} = a^2 + i$ , pentru orice număr real $a$ Cum, pentru orice număr real $a$ , $a^2 + i \neq 0$ , obținem că $\det A(a) \neq 0$ , deci, pentru orice număr real $a$ , matricea $A(a)$ este inversabilă	<b>2p</b> <b>3p</b>

<b>5p</b> <b>c)</b> $A(0) \cdot A(0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & i^2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_3$ $\underbrace{A(0) \cdot A(0) \cdot A(0) \cdots A(0)}_{\text{de 2022 ori}} = \underbrace{(-I_3) \cdot (-I_3) \cdot (-I_3) \cdots (-I_3)}_{\text{de 1011 ori}} = -I_3$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>5p</b> <b>2. a)</b> $x \circ y = xy - 6x - 6y + 36 + 6 =$ $= x(y-6) - 6(y-6) + 6 = (x-6)(y-6) + 6$ , pentru orice numere reale $x$ și $y$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>5p</b> <b>b)</b> Elementul neutru al legii de compozitie „ $\circ$ ” este 7 $x' \in \mathbf{Z}$ este simetricul lui $x \in \mathbf{Z}$ dacă $x \circ x' = x' \circ x = 7$ , de unde $x' = 6 + \frac{1}{x-6}$ ; $x \neq 6$ Cum $x' \in \mathbf{Z}$ , obținem $x = 5$ sau $x = 7$ , de unde rezultă că $(x, x') \in \{(5, 5), (7, 7)\}$ $x = 6$ nu este simetrizabil în raport cu legea dată	<b>1p</b> <b>2p</b> <b>2p</b>
<b>5p</b> <b>c)</b> $x \circ 6 = 6$ și $6 \circ y = 6$ , pentru orice numere reale $x$ și $y$ Deoarece legea „ $\circ$ ” este asociativă, avem $\underbrace{\frac{2022}{1} \circ \frac{2022}{2} \circ \frac{2022}{3} \cdots \circ \frac{2022}{2022}}_{x} =$ $\underbrace{\frac{2022}{1} \circ \frac{2022}{2} \circ \cdots \circ \frac{2022}{336}}_{x} \circ \underbrace{\frac{2022}{337} \circ \frac{2022}{338} \circ \frac{2022}{339} \circ \cdots \circ \frac{2022}{2022}}_{y} = x \circ 6 \circ y = (x \circ 6) \circ y = 6 \circ y$	<b>2p</b> <b>3p</b>

SUBIECTUL al III-lea		(30 puncte)
<b>5p</b> <b>1.a)</b> $f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1} \cdot x - \ln(x+1)}{x^2}$ $\Rightarrow x^2 \cdot f'(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$		<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>5p</b> <b>b)</b> $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \Rightarrow$ funcția nu admite asimptotă verticală. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$ $\Rightarrow y = 0$ asimptotă orizontală la $+\infty$ . Graficul funcției admite o singură asimptotă		<b>2p</b> <b>2p</b> <b>1p</b>
<b>5p</b> <b>c)</b> $f'(x) = \frac{1}{x^2} \left( \frac{x}{x+1} - \ln(x+1) \right)$ Cum $\frac{1}{x^2} > 0, \forall x \in (0, +\infty)$ , semnul derivatei este dat de semnul funcției $g(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$ , $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ . $g'(x) = -\frac{x}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in (0, +\infty)$ $\Rightarrow g$ este strict descrescătoare pe $(0, +\infty) \Rightarrow g(x) < \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = 0 \Rightarrow f'(x) < 0, \forall x \in (0, +\infty)$ $\Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe $(0, +\infty)$ . Cum $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ și $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \Rightarrow f(x) \in (0, 1) \Rightarrow a = 1$		<b>2p</b> <b>1p</b> <b>2p</b>
<b>5p</b> <b>2. a)</b> $F$ derivabilă pe $\mathbf{R}$ și $F'(x) = f(x)$ , ( $\forall x \in \mathbf{R}$ ) $e^x \cdot [ax^2 + (2a+b)x + (b+c)] = e^x \cdot (2x^2 + 3x + 4)$ , ( $\forall x \in \mathbf{R}$ )		<b>1p</b> <b>2p</b>

	Rezultă: $\begin{cases} a=2 \\ 2a+b=3 \\ b+c=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \in \mathbb{R} \\ b=-1 \in \mathbb{R} \\ c=5 \in \mathbb{R} \end{cases}$ .	2p
5p	<b>b)</b> Din a) $F(x) = e^x \cdot (2x^2 - x + 5) + c$ , $c \in \mathbb{R}$ este o primitivă oarecare a lui $f$ $A(0,2) \in G_F \Rightarrow F(0) = 2 \Rightarrow 5 + c = 2 \Rightarrow c = -3 \in \mathbb{R}$ $F(x) = e^x \cdot (2x^2 - x + 5) - 3$ , ( $\forall x \in \mathbb{R}$ )	2p 2p 1p
5p	<b>c)</b> Fie $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o primitivă oarecare a lui $f$ . $F$ convexă pe $\mathbb{R} \Leftrightarrow F''(x) > 0$ , ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ) $F''(x) = (F'(x))' = f'(x) = e^x \cdot (2x^2 + 3x + 4) + e^x(4x + 3) = e^x \cdot (2x^2 + 7x + 7)$ , ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ) Deoarece $e^x > 0$ , ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ) și $2x^2 + 7x + 7 > 0$ ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ) pentru că $\Delta < 0$ rezultă $F''(x) > 0$ , ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ). În consecință, $F$ convexă pe $\mathbb{R}$ .	1p 2p 2p

**Coordonator grup de lucru – M\_mate-info:**

- Bălănescu Daniela, inspector școlar pentru matematică

**Grup de lucru – Varianta 3 – M\_mate-info:**

- Dermengiu Alina, Colegiul Național *Mircea cel Bătrân* Constanța

- Gache Florian, Colegiul Național *Mircea cel Bătrân* Constanța

**Bibliografie – Matematică – M\_mate-info**

1. M. Andronache, D. Șerbănescu, M. Perianu, C. Ciupală, F. Dumitrel – *Matematică pentru examenul de bacalaureat – matematică-informatică*, Ed. Art Educațional, București, 2017.
2. M. Ganga – *Elemente de analiză matematică pentru clasa a XII-a*, Ed. Mathpress, Ploiești, 2000.
3. T. Cohal, Gh. Iurea - *Probleme de matematică pentru clasa a XI-a*, Ed. Paralela 45, 2012
4. A. Zanoschi, Gh. Iurea, G. Popa, P. Răducanu, I. Șerdean - *Bacalaureat 2016– matematică, M\_mate-info*, Ed. Paralela 45, 2015